

PRODUCTINFORMATIE

TOMCAT BLOX

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bruine ratten en huismuizen in afgesloten ruimten en in riolen. het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkistjes of -doosjes.

Bij gebruik in riolen moeten de lokaasblokken boven de waterlijn m.b.v. metaaldraad of een haak worden opgehangen of in vastgezette lokaasdoosjes of -kisten worden uitgelegd.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

Dosering:

Bestrijding van bruine ratten in gebouwen:

Plaats één blok van 225 g of 4 tot 10 blokken van 28 g per lokaasdoos en plaats deze lokaasdozen op 5-10 meter afstand van elkaar waar ratten of sporen van ratten zijn waargenomen. Blijf gedurende 10 dagen ononderbroken vers lokaas plaatsen of totdat de rattenactiviteit afneemt.

Bestrijding van bruine ratten in riolen:

Gebruik per station 1 blok van 225 g lokaas of 4 tot 10 blokken van 28 g. De lokaasblokken moeten boven de waterlijn m.b.v. metaaldraad of een haak worden opgehangen of in vastgezette lokaasdoosjes of -kisten worden uitgelegd. Controleer regelmatig of het lokaas is geconsumeerd en vervang geconsumeerd of bedorven lokaas totdat het niet meer wordt geconsumeerd. Herhaal de behandeling als er aanwijzingen zijn voor nieuwe besmettingen.

Bestrijding van muizen in gebouwen:

Plaats één blok van 28 g of 2 blokjes van 15 gram per lokaasdoos en plaats deze lokaasdozen op 2-4 meter afstand van elkaar waar muizen of sporen van muizen zijn waargenomen. Blijf gedurende 15 dagen ononderbroken vers aas plaatsen of totdat de muizenactiviteit afneemt.

Let op! De dosering moet worden aangepast aan de omvang van de populatie en aan beschikbare alternatieve voeding. Zoek en verwijder tijdens de behandelperiode regelmatig dode knaagdieren (behalve bij toepassing in riolen) en ten minste even vaak als u lokaas inspecteert en/of aanvult.

Gebruik - De bestrijding van ratten en muizen in gebouwen

Tomcat Blox is een kant-en-klaar lokaas in blokvorm; voor de bestrijding van ratten en muizen in gebouwen.

Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen of voeden. In het algemeen is dat langs muren, bij hol ingangen, in hoeken en op verborgen plaatsen op looppaden en bij plaatsen waar ze voedsel halen of knagen.

Langdurig gebruik: In de meeste gevallen moet lokaas met antistollingsmiddel binnen 35 dagen het gewenste resultaat hebben. Als knaagdieren na deze termijn nog steeds actief blijken te zijn, dient de meest waarschijnlijke oorzaak te worden bepaald.

Resistentie management:

Voor de werkzame stof in het middel, bromadiolon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met bromadiolon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten of muizen. Controleer daarom de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel voor ratten of muizen beschikbaar te zijn. Daarom in b.v. stallen 's avonds resten en gemorst voer verwijderen. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Voor het slagen van een bestrijdingsactie dienen voldoende voerplaatsen te worden ingericht. Het aantal voerplaatsen moet worden bepaald aan de hand van de situatie ter plaatse en de ernst van de plaag.

Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM).

Het middel mag niet preventief gebruikt worden.

Gebruik - De bestrijding van bruine ratten in riolen

Tomcat Blox is een kant-en-klaar lokaas in blokform; voor de bestrijding van bruine ratten in riolen. Tomcat Blox is geschikt om te gebruiken op vochtige plaatsen. Bij gebruik in riolen dient er voor te worden zorg gedragen dat het lokaas bevestigd is boven de gewoonlijk hoogste te bereiken waterstand. Zet de blokken zodanig uit dat ze niet onnodig worden bevuild en dat ze altijd bereikbaar blijven voor de ratten.

Gebruik per station 1 blok van 225 g ofwel 4-10 blokken van 28 gram lokaas. De lokaasblokken moeten boven de waterlijn m.b.v. metaaldraad of een haak worden opgehangen of in vastgezette lokaasdoosjes of -kisten worden uitgelegd. Controleer regelmatig of het lokaas is geconsumeerd en vervang geconsumeerd of bedorven lokaas totdat het niet meer wordt geconsumeerd. Herhaal de behandeling als er aanwijzingen zijn voor nieuwe besmettingen.

Langdurig gebruik: Tenzij onder toezicht van een expert in ongediertebestrijding of een andere deskundige, gebruik geen verdelgingsmiddel met antistollingsmiddel als permanent lokaas. In de meeste gevallen moet lokaas met antistollingsmiddel binnen 35 dagen het gewenste resultaat hebben. Als knaagdieren na deze termijn nog steeds actief blijken te zijn, dient de meest waarschijnlijke oorzaak te worden bepaald.

Resistentie management:

Voor de werkzame stof in het middel, bromadiolon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difenacoum of bromadiolon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

Voor het slagen van een bestrijdingsactie dienen voldoende voerplaatsen te worden ingericht. Het aantal voerplaatsen moet worden bepaald aan de hand van de situatie ter plaatse en de ernst van de plaag.

Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM).

Het middel mag niet preventief gebruikt worden.

Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van ratwering.



Maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:

- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
- Na gebruik handen wassen
- Het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden.
- De lokaasdozen markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten.
- Plaats het lokaas in lokaasdozen buiten het bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen
- De lokaasdozen niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen.
- Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren.

Klinische symptomen:

Neusbloedingen, bloedend tandvlees, bloed spugen, meerdere of grote bloeditstoringen, over het algemeen plotseling optreden van een ongebruikelijke viscerale pijn.

Biologische symptomen:

Bloed in de urine, toegenomen stollingstijd.

Eerste Hulpmaatregelen:

Houdt dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.

In geval van orale opname: Spoel de mond met water. Braken niet opwekken.

In geval van blootstelling aan de ogen of de huid: onmiddellijk afspoelen met water.

In geval van nood contact opnemen met een dokter.

Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding)

Aanwijzingen voor veilig afvoeren:

Uiterlijk 6 weken nadat de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural). Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

Risicozinnen:

- Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgszinnen:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- Draag beschermende handschoenen
- Bij onwel voelen een arts raadplegen.
- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

TOMCAT BLOX

Werkzame stof

Gehalte

Aard van het preparaat

Toxicologische groep

Giftigheid

Verpakkingen

Toelatingsnummer 11885 N

Bromadiolon

0,005 %

Lokmiddel in blokvorm

Anti-coagulant

geen

doos à 2 x 4 kg emmer

doos à 40 x 225 gram

Droog bewaren